

# MOLUSK®

CZ

## Kožní roztok k opláchnutí

Léčba molusek



**PŘED POUŽITÍM PŘÍPRAVKU MOLUSK® SI PŘEČTĚTE  
TENTO NÁVOD NA POUŽITÍ  
OBSAHUJE DULEŽITÉ POKYNY O ZPŮSOBU POUŽITÍ**

### VAROVÁNÍ!

Tento roztok je žiravina a musí být opláchnut.

### INDIKACE

Lokální léčba molusek (*Molluscum contagiosum*).

### VAROVÁNÍ A OPATŘENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ

**TENTO ROZTOK MÁ ŽIRAVÉ ÚČINKY. POUŽÍVÁ SE JAKO LEPTAVÉ ČINIDLO. ROZTOK APLIKUJTE PEČLIVĚ, VÝHRADNĚ NA LÉZE, KTERÉ JE ŽÁDOUCÍ OŠETŘIT. PO APLIKACI OPLÁCHNĚTE A DŮSLEDNĚ SE ŘIĎTE NÁVODEM K POUŽITÍ.**

- Neaplikujte roztok na stejnou lézi déle než 10 po sobě jdoucích dnů.
- Neaplikujte na zdravou pokožku.
- Nepoužívejte u dětí mladších dvou let.
- Nenanášejte přípravek na místa s tenkou nebo citlivou kůží, například na sliznice nebo kolem očí. Přípravek nesmí za žádných okolností přijít do styku s očima.
- Neaplikujte na podrážděnou nebo infikovanou pokožku, zarudlou pokožku nebo pokožku vykazující známky zánětu.
- Neaplikujte na pokožku, na níž zpozorujete neobvyklé projevy.
- Neaplikujte na bradavice.
- Nepolykejte. Nedoporučuje se používat na obličej.
- Nepoužívejte v případě infikovaných lézí *Molluscum contagiosum*.
- Produkt není vhodný pro diabetiky. Zasažená oblast by se mohla hojit pomaleji nebo pouze částečně
- Při kojení nepoužívejte na částech těla, které přicházejí do styku s kojencem.
- Nepoužívejte v případě alergie na kteroukoli ze složek přípravku.
- Je důležité vyvarovat se škrábání či dotýkání se ošetřovaných lézí dokud zcela vymizí. Tímto se

- předejde vzniku superinfekce.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Vyhnete se kontaktu s oděvem nebo jinými materiály, které by mohly být ovlivněny zásaditými látkami.

### V případě náhodného kontaktu:

- Pokud se přípravek dostane do očí, ihned začněte vyplachovat oči po dobu 15 minut velkým množstvím vody. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a lékaři předložte tento Návod na použití.
- V případě kontaktu přípravku se zdravou pokožkou okamžitě opláchněte pokožku velkým množstvím vody.
- Pokud se Vám výrobek dostane na prsty, nedotýkejte se očí ani sliznic. Ihned si umyjte ruce.

**Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.**

### NÁVOD NA POUŽITÍ

Přípravek se smí aplikovat **jednou denně**, pokud lékař neurčí jinak. Po aplikaci nechte přípravek zaschnout po dobu 1-2 minut a poté opláchněte. Aplikujte MOLUSK® na lézi špičkou aplikátoru (štetce), který držte kolmo ke kůži a nedotýkejte se zdravé pokožky. Aplikaci opakujte každý den, **dokud nedojde k zarudnutí**, podráždění nebo otoku léze, což nastane nejpozději během 4–6 dnů. V tomto okamžiku **zastavte léčbu** a na lézi již roztok neaplikujte. Zánět je známkou toho, že léze *Molluscum contagiosum* vymizí během příštích 2 až 5 týdnů. Pokud se zánět neobjeví, můžete pokračovat v každodenní léčbě lézí, které se ještě nezanitily, dokud se nevyvolá zánět.

Správná aplikace přípravku MOLUSK® a postupné změny lézí:

### APLIKACE

Aplikujte MOLUSK® na lézi jednou denně, pouze jediným dotykem. Nanášejte roztok špičkou štetce, který držte kolmo ke kůži a nedotýkejte se zdravé pokožky. Nechte zaschnout (1-2 minuty).

### OPLÁCHNUTÍ

Poté léze opláchněte pomocí gázy namočené ve vodě.

### ZČERVENÁNÍ LÉZE

Po 4–6 dnech základna léze postupně zčervená, nebo dojde k jejímu podráždění nebo zanícení. Léčbu takového léze ukončete.

### VYMIZENÍ MOLUSEK

Po 2–5 týdnech molusky zcela vymizí.

**UPOZORNĚNÍ:** Pokud budete pokračovat v léčbě oblasti, která je již zanícená nebo podrážděná, může dojít v ošetřované oblasti ke vzniku vrádku. Nepoužívejte přípravek na stejnou lézi více než 10 po sobě jdoucích dnů. Pokud některý den vynecháte, neaplikujte roztok druhý den dvakrát. Aplikujte jej vždy pouze jednou a pokračujte, dokud léze nezčervená.

### JAK ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK APLIKOVAT

*Tento přípravek smí aplikovat pouze dospělé osoby. Děti by neměly s přípravkem zacházet, ani se jej dotýkat rukama poté, co jim byl aplikován dospělými.*

### KROK 1: APLIKACE

Odsroubujte uzávěr lahvičky a zasuňte aplikační tyčinku (štetec) do lahvičky. Vyjměte navlhčenou aplikační tyčinku, a **co nepečlivěji naneste přípravek jemným poklepáváním špičkou štetce kolmo ke kůži na každou lézi**, bez zasažení zdravé pokožky. Pro pozdější opakované použití lze přípravek skladovat s nasroubovaným aplikátorem. **Vyvarujte se zasažení zdravé pokožky kolem léze, aby nedošlo k jejímu podráždění.**

**VAROVÁNÍ! Zabráňte kontaktu roztoku se zdravou pokožkou a jakýmkoli jiným povrchem (oblečení, citlivé povrchy atd.), protože se jedná o žiravou látku. Pokud by došlo k potřísnění, okamžitě opláchněte zasaženou oblast velkým množstvím vody.**

### KROK 2: ZASCHNUTÍ (VYČEKTE 1-2 MINUTY)

Po nanesení (krok 1) nechte přípravek zaschnout po dobu 1-2 minut. Nedotýkejte se ošetřovaných oblastí během zasychání přípravku. Zajistěte, aby se děti nedotýkaly ošetřených oblastí během zasychání přípravku.

### KROK 3: OPLÁCHNUTÍ

Po zaschnutí odstraňte zbytky přípravku opláchnutím vodou (například pomocí namočené gázy) a umyjte si ruce velkým množstvím vody.

**Léčba může způsobit pálení a podráždění, pokud roztok neopláchnete.**

OPAKUJTE TYTO TŘI KROKY JEDNOU DENNĚ PRO KAŽDOU LÉZI, KTEROU JE POTŘEBA OŠETŘIT.

**Jakmile zaznamenáte podráždění, zarudnutí nebo otok, okamžitě zastavte léčbu příslušné léze. Jakmile se vyskytnou tyto příznaky zánětu, léze nevyžaduje další léčbu. Je nutné několik týdnů počkat, než léze vymizí.**

Po čtyřech týdnech od prvního otevření lahvičky zlikvidujte. *Nevyhazujte tento výrobek do odpadních*

*vod ani domovního odpadu. Nespotřebovaný přípravek vraťte prosím do lékárny.*

### NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Léčba může způsobovat svědění, bolest a přechodný pocit pálení v oblasti, kde byl přípravek aplikován. Léčba může způsobovat popáleniny a kožní léze, obzvláště když je přípravek používán na zdravou pokožku nebo není opláchnut.

Po vymizení léčené infekce *Molluscum contagiosum* se může objevit hyperpigmentace nebo hypopigmentace, která však spontánně ustoupí.

**Pokud se vyskytnou nežádoucí účinky spojené s používáním přípravku MOLUSK®, poraďte se se svým lékařem.**

Pokud si myslíte, že ve spojitosti s užíváním přípravku došlo k závažnému nežádoucímu účinku, oznamte to prosím příslušnému úřadu a výrobci.

**SLOŽENÍ:** 10% hydroxid draselný, voda.

### CO JE LÉZE MOLLUSCUM CONTAGIOSUM?

#### A CO JE MOLUSK®?

Molusky jsou nakažlivé nezhoubné kožní onemocnění, které je vyvoláno virem ze skupiny poxviru (*Molluscum contagiosum*). Infekce způsobuje léze (puchýřky, pupínky) na kůži a je běžná u dětí ve věku 2 až 5 let, ale může se vyskytnout i u dospívajících a dospělých osob. Vyhybejte se škrábání infikovaných lézí a zabraňte přímému kontaktu zasažených částí kůže s jinými osobami (bezprostřední kožní kontakt) a nepřímému kontaktu prostřednictvím ručníku, mycích hub, koupelí, bazénu apod., abyste zabránili šíření viru.

MOLUSK®, 10% roztok hydroxidu draselného, je žiravina s velmi zásaditým pH a leptavým účinkem, která působí zevně na kůži a denaturuje proteiny tkáně.

### BALENÍ

MOLUSK® kožní roztok, se dodává v hermeticky uzavřené lahvičce s aplikačním štetcem. Obsahuje 3 g roztoku.


Ušchovejte tento návod na použití do konce doby použitelnosti výrobku.

Datum poslední aktualizace Návodu na použití: červenec 2019

  
Pierre Fabre

 0051

Medicinský prostředek  
Výrob medyciny  
Zdravotnický prostředek  
Zdravotnická pomocná

  
LABORATORIOS VIÑAS  
Provença 386 - 08025 Barcelona  
SPAIN

Distributor:  
PIERRE FABRE DERMATOLOGIE  
45 place Abel Gance  
92100 Boulogne - France  
Distributor v Polsce:  
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska Sp. z o.o.  
ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa  
tel. 22-559-63-60  
Distributor/Distributor:  
PIERRE FABRE DERMATOLOGIE TSCHEQUIE, S.R.O.  
Prosecká 851/64 - 190 00 Praha 9  
Česká republika  
Telefon: +420 286 004 111